

FELADAT

Halálosan mérgező gombák



Forrás:



Fehér galóca
(*Amanita verna*)

Kalap: Félgyömb alakúból domború, majd kiterülő, kb. 5-8 cm széles. Kézdetben hófehérek pelyhes, bőre lehűzhető. Lemezek: Sürűn állók, nem lefűtök, a kalap szélén szélesesbök, fehérök. Sporopora fehér. Tönk: Kacsás, 8-15 cm hosszú, 0,5-2 cm vastag, törönök, később esetleg odvastodó. Színe fehér. Galérija lelőgő. A tönk alján 0,5 cm-es fejtett bocskor van, amely nem ritka a tönkre tapad. A bocskor a tönk gumos tövével együtt mélyen az avába sullyed, és konnyen belezakad. Hus: Fehér, elegyé puha, vizenyős, hamar romlik.

Szag és íz: Szaga többnyire jelentéktelen, ölykör a gyilkos galócahez hasonló. Az idősebb példányok íze lehet kissé csipős, kapros.

Törzsnél: Nincs szemcséb mezes halász érdében termő gyökérképesset gomba, amely inkább a melegbőr vidékén fordul elő. Függetlenné válhat, egysével vagy néhány példány együtt nő. Már májusban eléghet és októberig elfordul.

Kalap: 1-5 cm átmérőjű; kézdetben kúpos, domború, majd kiterül; okkersárga, sárgásbarna színű. felülete sima, pereme áttetszően bordás. Lemezek: A tonhöz kötött, esetleg kissé lefelülről, stírtan állók; elosztó okkeresek, később fehérök. Tönk: 2-8 cm hosszú, 0,3-0,8 cm vastag, hengeres, gyakran görbe, üreges; felületi szálas színű. Vékony, barnás színű, felületén rozsdabarna, a tönkben barna. gyengén liszt szagú és ízű. Sporapor: Rozsdabarna.

Előfordulás: Szepiembertől novemberig, fenyőlusukon, ritkábban lombos fák korhadékán, egységenként vagy kis csoportban nővő, nem gyakori faj.



Fenyves turángomba
(*Galerina marginata*)



Gyilkos galóca
(*Amanita phalloides*)

Halálosan mérgező gombák

Készítésnél egy szótölölapot néhány halálosan mérgező gombafajtával! A feladat nyers szöveget a mellékelt **halálos** .**txt** fájlból találja. Munkáját mentse **halálos** néven! A feladatban Times New Roman illetve Arial betűtípusokat használjon! A megoldás során kövesse a mintát!

1. A szórólap A4-es méretű, minden oldalán 2cm-es margóval! A lapot szegyezzze figyelmemfelkeltő, piros oldalszegéllyel!
2. A lap tetején alakítson ki egy táblázatot a minta alapján! A táblázat magassága 3cm, az első és utolsó oszlop szélessége 4cm, szegelye 2-3 pont vastag, folyamatos vonal, mintázata a (255;229;229) RGB színkódú világos piros. A táblázatban nincsenek cellamargók.
3. Az első és harmadik cellába illessze be a mellékelt **halalfej**.**.png** képet, majd méretezze át azokat arányosan 3 cm szélesre!
4. A középső cellában alakítsa ki a címet piros színnel, 25 pontos félkövér betűkkel! Állítszon be ritkítás és csökkenett sorközöt!
5. A táblázat alá, jobbra igazítva készítse el a forráshivatkozási! Szúrja be a mellékelt **gombanet**.**.png** képet és alakítsa a szövegfajlban levő címre mutató hiperhivatkozássá! A kép magasságát állítsa arányosan 12 pontosra!
6. Készítse el a négy gombát ismertető táblázatot a következő leírás és minta alapján!
7. A táblázat mintázata megegyezik a felső táblázatval szegelye vékony, piros vonal.
8. A bal oldali cellában helyezze el a gombák képeit! A képek fájlneve megegyezik a gombák latin nevével, jpg formátumban. A képek szélességét állítsa be arányosan 5cm-re!
9. A jobb oldali cellákba másolja be a gombák leírását! A leírás legyen 8 pontos, sorkizárt! A szempontokat állítsa félkövérre

Kalap: 5-15 cm átmérőjű; domború, majd ellaposodik; olív-, sárgás-, barnászöldes, de lehet fehér. Lemezek: fehérök benőtlen szálak, csak ritkán van rajta fehér és burkolatárvány. Lemezek: Stírtan és szabadon állók, szélesek; fehérök. Tönk: 7-20 cm hosszú, 1,2-2,5 cm vastag; hengeres; fehérök; fehérök; gyakran zoldesen műrványozott felületű; lelőgő, fehér galérija és a gumós övén bő elálló szélfű. fehér bocskora van. Sporapor: Fehér. Előfordulás: Júniustól novemberig, lomberdőben, fügöl tölgyleg alatt, ritkán fenyvesben nővő, gyakran faj.

Kalap: 2-4 cm átmérőjű; pupos, harang alakú, majd ellaposodik. közepén kissé pipos marad; széle gyakran hullámos, behasadózó; fehérök alapszínű felületén bibrókbanás biborbanás; sima. Lemezek: Stírtan és szabadon állók, szélesek; fehérök, borvörösben fotosszíntelenek. Tönk: 2-4 cm hosszú, 0,9-1,5 cm vastag; hengeres; fehérök; fehérök; fehér bocskora van. Hus: Vékony, puna, torzkeny; fehérök; fehérök; fehérök; fehérök. Előfordulás: Május-tól októberig, többnyire homokos talajú lomberdőben, erdőszélen, út mellett nővő, nem ritka faj.

Húsbarnás ózibogomba
(*Lepiota brunneoincarnata*)